

子宮頸部レーザー蒸散術 治療説明・同意書

[施術の流れ]

- ① 問診、内診を行います。
- ② 腔内に専用プローブを挿入し、レーザーを照射します。(約5分程度です)
痛みはほとんどありませんが、痛みが強い場合は、痛み止めの坐薬を使用します。

[術後の注意点]

- 食 事：特に制限はありません。好きなものをお取りください。
- アルコール：術後数日及び出血がある時は控えてください。
- お 風 呂：翌日から可能です。当日はシャワーのみ可です。
- お 仕 事：翌日から通常のお仕事ができます。
- 運 動：出血されなければ、運動は翌々日から可能です。
- 性 交 渉：約1ヶ月間禁止となります。

[術後の受診]

術後診察は、2週間後となります。

[術後の症状について]

術後疼痛はほとんどありません。まれに術後24時間以内で生理様の痛みを感じる場合があります。気になる場合は、お手持ちの鎮痛剤を服用していただくことは可能です。

術後翌日位から水様性帯下がみられます。黒い焦げたものが混じることがあります。

おりものは大体7~10日間位続きますので、必要に応じて、おりものシート等をご準備ください。

おりものが減ってくる7~10日間位から少量の出血をみることがあります。新しい上皮を作るための新生血管からの出血であれば問題ありません。大体1週間位続きますが、いつもの生理以内の量であれば、様子を見ても構いません。

[治療効果判定のための術後6週間目の検査がとても重要です]

子宮頸部異形成に対するレーザー蒸散術は体に対する侵襲が少ないのが最大のメリットですが、病巣を気化蒸散させてしまうので十分か効果があったかどうか、すぐにはわかりません。

正確な効果判定するためには、新しい上皮に入れ替わる**術後6週間目あたりでの詳しい検査**を待ついただくこととなります。その結果により、その後の異形成の管理方法が決まります。

次回の検診時期は _____ 月 です。

子宮頸部レーザー蒸散術 同 意 書

私は、この施術について十分な説明を受け、内容を理解いたしましたので、本施術を受けることに同意します。

同意日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

署 名： _____ 印